

扫码关注 12316 专家短视频



答疑解惑

长春市王先生：猪舍怎样消毒

答：猪舍空舍时可先选用喷灯火焰消毒，然后使用2%氢氧化钠（火碱）溶液对舍内进行喷洒消毒，最后采用高锰酸钾甲醛熏蒸的方法进行彻底消毒。如果舍内有猪的情况下，常用的消毒剂有：过氧乙酸、戊二醛、碘制剂、漂白粉、石灰乳、季胺盐类、复合酚等，可以选择两种以上不同的消毒剂交替使用，效果更佳。（薄晓威）

白城市刘先生：羊肝蛭病用什么药物治疗

答：杜绝羊肝蛭病的发生应先做到定期驱虫，每年春季一次、冬季一次，驱虫的粪便要堆积发酵杀死虫卵，同时加强饲养管理，不到低洼地放牧，小的池塘可饲养家鸭消灭羊肝蛭中间宿主淡水螺。发病治疗可用硫氯酚、丙硫咪唑等驱蛔虫的药物进行驱虫，药物的使用方法要严格按照说明书使用，注意孕羊禁止驱虫，以免造成流产。水肿不是很快就能下去的，应该被机体慢慢吸收逐渐消除，若是7天后又肿起来，应该再用一次药。（吴迪）

汪清县李先生：大豆可以自留种吗

答：常规大豆可以自留种，留种的地块一定要去杂去劣，依据品种特性，将不同花色的植株去除，依据叶型、植株结荚和生长形态等不同及时去弱、病、杂株，选择纯度较高、健壮整齐植株留种。即使是常规大豆也不建议自留种，因为种子是有选育过程的，是保证粮食质量的。（王建成）



萝卜「黑心病」要早预防

蔬菜专家 刘雅忱

当前秋萝卜正值肉质根膨大期（田间正处于“鼓肚中期”），此时对于硼元素需求比较敏感，如缺乏极易造成“黑心病”。“黑心病”发病初期很难被发现，一旦发现症状，基本失去了防治价值，所以，一定要及时预防，采取适宜的防治办法。

萝卜“黑心病”在发病初期切开肉质根，可见肉质根内部的形成层和木质部组织呈灰白色或褐色，随着病情的发展，可见植株生长缓慢、矮化，叶片变小且少，出现畸形叶片。生长点处叶片干枯坏死，肉质根表皮粗糙、黑皮等症状的出现。拔出肉质根，可见根系少，且扭曲变形，抛开肉质根可见中部有水渍状，有的出现髓部腐烂、黑色空心等症状。

为了防止生理性病害的发生，定植时底肥中施入适量的硼元素，每公顷施入硼砂2千克左右或其它适量硼肥。在萝卜“鼓肚期”结合叶面追肥喷施1000倍液的硼肥，但应注意不要与磷、钙元素一起施用，以免造成硼肥的失效。干旱时要及时浇水，避免土壤过分干旱影响硼元素的吸收。每公顷施用腐熟的有机肥5000千克左右或生物有机肥200千克，增加土壤的有机质含量，提高土壤的保水保肥能力，促进根系的生长，提高根系对硼元素的吸收能力。在生长期如发现缺硼症状要及时补充，可用液体硼肥灌根或叶片喷施，每5-7天一次，连续2-3次。

（刘雅忱）

羔羊痢疾防治方法

畜牧兽医专家 王开

至常温以下，若不及时救治，多在数小时或十几小时内死亡。

治疗。可选用如下方法进行：土霉素0.2-0.3克、胃蛋白酶0.2-0.3克，加水灌服，每天2次；磺胺脒0.5克、单宁蛋白0.2克、次硝酸铋0.2克、碳酸氢0.2克，加水灌服，每天3次；先灌服含0.5%福尔马林的6%硫酸镁溶液30-60毫升，6-8小时后再灌服1%高锰酸钾溶液10-20毫升，每天2次；如并发肺炎，可用青霉素、链霉素各80万单位，混合肌

如何判断果品的成熟度

果树专家 高玉江

色开始出现、种子成熟时，着色的品种要果实充分着色。

肉硬度：果实成熟过程中，果肉硬度明显降低，这既可以用硬度计测量，也可以凭口感判断。香水梨、软枣猕猴桃等有一个后熟过程，可以在果肉硬时采摘。

可溶性固形物含量：可以用手持折光仪测定。比如酿酒葡萄品种可溶性固形物含量要达到17%以上才能采摘。

果实生长日数：各个果树品种从盛花期到采收成熟期的日数往往是比较稳定的，如苹果梨生

长期130天，因此可以根据每年的开花期，推测合适的果实采收期。

果实脱落的难易程度：苹果、梨、李子、杏子果实成熟时，果柄和果台枝中间形成离层，只要轻轻托起果实或稍加转动即可脱落。

其他方法：有条件的地方，还可以测定果实的乙烯含量，在成熟时往往会有一个高峰；也可以测定香气等物质的含量，为确定适宜采摘日期提高更加科学的依据。

笼养蛋鸡强制换羽可提高效益

畜牧兽医专家 薄晓威

笼养蛋鸡强制换羽可唤起蛋鸡的第二次产蛋高峰期，提高养鸡效益。

强制换羽前的准备：换羽前将病鸡、弱鸡、已换羽的鸡挑出后，换羽前10天投一次维生素C和一个疗程的抗生素，料中按每只鸡加入20克贝壳粉，肌注一次新城疫Ⅰ系疫苗。鸡舍温度控制在15-20℃，湿度65-75%。鸡舍全面消毒，谢绝来访。按10%随机抽取一定数量的鸡作为测试用鸡，称总重，并计算出平均体重数，记录备查。

强制换羽的方法：如下方法可根据情况选择。

化学法：料中加入硫酸锌达到含量2-2.5%，连喂7天，第8天开始喂正常料，第10天产蛋停止，3周后可恢复产蛋。减少料中钙和食盐的含量，钙从3%降至0.09%，2周产蛋率下降至3%。此法很慢，可用于产蛋后期。

饥饿法：又称三断法，即

断水、断料、断光。

快速法：断水两天，停料10天，停止补充光照，密闭舍光照减到8小时，此间料中加贝壳粉。10天后自由采食，恢复光照。可在6周内使母鸡恢复50%产蛋率。

普通法：停料10天，自由饮水，停止补充光照，密闭舍光照减到8小时，此间料中加贝壳粉。11天恢复光照并喂蛋鸡料。在5-8周内使母鸡产蛋率达到50%。

慢速法：停料10天，自由饮水，停止补充光照，密闭舍光照减到8小时，第11天起连续喂4周碎颗粒料，以后自由采食蛋鸡料并恢复光照。可在9-10周内恢复产蛋率达50%。

综合法：1-3天停水、停料、不补光，第4天喂给含2-2.5%的硫酸锌的料、供给充足的饮水，连喂7天。第10天产蛋可能全停，此时恢复光照，换羽后20天开始重新产蛋，50天产蛋率可达50%。

强制换羽的注意事项：

换羽的最佳日龄以62-65周龄的健康鸡为好，不要超过72周龄。要避开夏季和冬季，以秋季为好。

低产蛋鸡群不宜强制换羽，而高产蛋鸡群采取强制换羽后会获得较高的产蛋率和产蛋时间（6-7个月）。但仍要比换羽前的高峰期的产蛋率低10-15%。

饥饿法断料时间以10-12天为好。每3天称重供测试鸡的体重，并计算平均数，当减少25-30%时，或死亡率接近3%时，要恢复供料，供料的第一天每只鸡仅供20克，以后每天增20克，第6天时恢复自由采食。

最好先进行小批量的试验，取得经验和数据后再进行大群强制换羽工作。

换羽后鸡群的第二个产蛋高峰期可维持180天，而且蛋的破损率低，蛋重明显高于换羽前。体重增加，下架后商品价值明显提高。

羔羊痢疾是初生羔羊的一种急性毒血症。以剧烈腹泻和小肠发生溃疡为特征。

本病可使羔羊大批死亡，给养羊业带来损失。病原为B型魏氏梭菌。主要发生于7日龄以内的羔羊，尤以2-5日龄羔羊发病为多。潜伏期1-2天。病初精神萎顿，低头拱背，不想吃奶；不久即下痢，粪便恶臭，有的稠如面糊，有的稀薄如水，颜色黄绿、黄白甚至灰白，部分病羔后期粪便带有血或为血便。病羔虚弱，卧地不起，常于1-2日内死亡。个别病羔腹胀而不下痢或只排少量稀粪，主要表现为神经症状，四肢瘫痪，卧地不起，呼吸急促，口流白沫，最终昏迷。体温降

水稻成熟期田间管理意见

水稻专家 李晓光

现阶段水稻进入成熟期，应继续监测病虫草害，及时防控后期病虫草害的发生；同时促早熟，预防低温，加强田间水肥管理，适时收获，才能确保丰产丰收。

加强病虫草害防控

继续加强病虫草害监测，及时掌握病虫草害发生情况。对于病虫害发生严重地块，收获后要及时清除田间病稻茎，减少明年病虫害侵染源。对于田间杂草发生严重地块，在杂草种子成熟前及时清除，防止成熟草籽落在地里，增加明年杂草基数。及时清除田埂、灌水渠等周边杂草，减少明年的杂草基数，降低病虫害传染源。

防低温 促早熟

关注天气变化，提前做好准备，通过水肥调节等措施尽可能避开低温。适时喷施磷酸二氢钾和尿素等叶面肥、水溶肥，补充植株养分，增强抗寒能力。适时断水，防止贪青晚熟。但断水过早，会影响籽粒灌浆，造成空秕粒增多，千粒重下降，易早衰倒伏。要根据地块的实际情况，如果是低洼不易排水地块要早断水。

适时收获

当90%以上籽粒黄熟，籽粒充实饱满坚硬时，为最适收获期，要及时收获。如果发生低温冷害，可适当推迟收获，延长后熟生长期，促进根茎储存养分向籽粒转移，减轻冷害影响，但应在枯霜前收获，以免影响稻米质量。对于倒伏后稻穗出现霉变或发芽的田块，应和正常成熟水稻分开收获，避免影响稻谷质量。

免费搭建供求桥梁，连接城乡市场，为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物品的供求信息，欢迎来电来信。联系电话: 0431-88600735

或拨打 12316 新农村热线 12582 农信通热线

求购

长春地区

■玉米120吨，1.3元/斤，长春市双阳区鹿乡镇孙先生。电话: 15948263106

通化地区

■二手打豆机器一台，1000-2000元，柳河县三源浦镇张先生。电话: 13278355358

辽源地区

■白鹅3000只，8元/只，辽源市西安区灯塔乡王先生。电话: 13766085771

延边地区

■大量谷草，价格面议，敦化市孙先生。电话: 13043378373

出售

长春地区

●油莎豆酒，农安县永安乡齐先生。电话: 13604393993、15947845933

●白菜20吨，0.3元/斤，榆树市八号镇刘先生。电话: 15567042756

●玉米饲料压片，量大优惠，榆树市五棵树镇王先生。电话: 13596446777

●黑豆1万斤，3元/斤，农安县万金塔乡孙先生。电话: 13159681495

●粉碎机(粉饲料)1台，1200元/台，农安县新农乡左先生。电话: 15947802536

●8年生王族海棠1000棵，150元/棵，德惠市边岗乡郭女士。电话: 18744184191

●大公鸡1600只，15元/斤，农安县伏龙泉镇邹女士。电话: 13500862193

●榆树20棵，300元/棵，德惠市米沙子镇梁先生。电话: 18744181614

●黑腿笨鸡1000只，16元/斤，长春市九台区苇子沟镇张先生。电话: 15948211718

吉林地区

●常年出售中草药喂羊无抗鸡蛋，永吉县于先生。电话: 15590628181

●常年出售西门达尔牛，吉林市杨先生。电话: 15843775177

●常年出售散养藏香猪肉礼盒，舒兰市李女士。电话: 13234324222

四平地区

●牛150头，1.5万元/头，伊通县营城镇张女士。电话: 15044465057

●黑豆7000斤，2.2元/斤，双辽市双山镇李女士。电话: 15500418987

松原地区

●杨树苗和杨树50万棵，松原市宁江区新城乡万先生。电话: 18343827069

通化地区

●桑黄、灵芝孢子粉，通化县高女士。电话: 18626537627

●常年出售蔬菜大棚保温棉被、养殖场保温棉被，梅河口市周先生。电话: 13634352838

白城地区

●常年出售绿色种植小麦面粉，大安市沈先生。电话: 15844654488、15143636865

白山地区

●长白山赤灵芝、野黑蜂蜂蜜，长白山自家种植基地灵芝孢子粉，敦化市孟女士。电话: 4001801778、15844385121

延边地区

●达维254、110，辽榛8号等多个品种大果榛子，敦化市李先生。电话: 15844346245