

扫码关注 12316 专家短视频



答疑解惑

农安县王先生:

牛奶水不足怎样调理

答:如果是老牛,而且仅是奶水不足,乳房没有问题,可以饮豆浆,并加入10%的葡萄糖,每天一次,连用三天。如乳房发育不好,可以在料中拌入催奶中药,如催奶仙方,或用木瓜、淫羊藿、红花、益母草各50克煮水灌服,每天一次,连服3天。(薄晓威)

大安市刘先生:

肉鸡法氏囊炎啥症状

答:肉鸡法氏囊炎主要症状是打蔫缩颈、羽毛蓬乱、粪便白色、污染肛门,传染快,死后可见腿、胸肌有紫色出血斑,肾脏尿酸盐沉积,法氏囊肿大出血等。预防可根据情况在7-14日龄接种法氏囊苗,此病一旦发生,无任何特效药物可以治疗,发病初期注射卵黄抗体治疗有一定效果。(高明辉)

洮北区李先生:

水稻立枯病咋预防

答:水稻立枯病一般是在春季低温寡照、多雨、育苗床地潮湿的情况下容易发生。预防方法:一是适当晚育苗,二是在育苗土里多加杀菌剂,如甲霜灵、福美双、立枯一次净等,发病后在苗期1.5、2.5、3.5叶时可选用立枯一次净、枯必净、瑞苗青等防治,同时要结合浇PH值4-4.5的酸化水。(张艳艳)



仔猪饲养方法及用料

畜牧兽医专家 吴迪

仔猪断奶后的饲养方法及用料,关系到以后的健康和生长速度。刚断奶的仔猪如喂料过多,易造成消化不良和下痢。所以,断奶后的前四五天要限饲,要少量勤添,每昼夜可喂6-8次,以后逐渐减少次数。日投料量控制在日粮的70%左右,经四五天后逐渐增加投给量。每次投料量要依据仔猪采食、粪便状况以及活动状态灵活掌握。

依据仔猪采食情况投料。喂第二餐时要先看槽,如果槽底是否有剩余碎料,如果没有下次应增加料量;如果槽中有剩料,说明上次喂量太多,应当减量。

观察仔猪排粪状况投料。仔猪断奶3天以内的粪便由粗变细,由黄色变为褐色,为正常粪便。观察粪便的时间是每天12时至15时。粪便变软、油光发亮、色泽正常,证明投料量适当,不用增加或减少;如果圈内有少量零星粪便呈黄色,内有饲料颗粒,说明有的仔猪抢食过量,本次投料应比上次减少20%左右;如果发现粪便呈糊状,淡灰色,并有零星呈黄色的粪便,内含未消化料粒,这是全窝仔猪要下痢的预兆,应停食一顿,下顿也只能喂停食前的一半,第三顿再视情况而定;如果看到圈内大部分粪便变软、变黑,投料量可恢复到正常喂量的80%,再下一顿可恢复到正常用量;如果排粪是糊状、绿色,粪内混有脱落的胆肠粘膜,要停食两顿,第三顿只在槽底撒少许饲料,逐渐增加投料量,经三天后再逐渐恢复到常量。

根据仔猪活动情况投料。喂食前仔猪听到响声蜂拥到槽前,叫声不断,说明饥饿,可多喂点饲料;给料10分钟后,槽内饲料被抢食一空,仔猪仍不回窝,在槽前拥挤张望,说明料不足,可适当增加投料量;有时仔猪在喂料前也来到槽边,但叫声小而弱,不慌张,说明不太饿,可少投些料。

仔猪断奶在限饲阶段,料形要与哺乳期保持一致,并保证供给充足清洁的饮水。整个限饲期7-10天,以后改为日喂4顿。

为确保仔猪健康生长,顺利度过断奶期进入后备期,圈舍要定期消毒,保持空气通畅,环境要干燥、清洁、卫生。

猪圆环病诊断与防治

畜牧兽医专家 刘清河

猪圆环病于1997年先后在加拿大和新西兰发现,2001年传入我国,近几年,我省好多猪场已有发生。因感染猪的发病日龄不同,其临床表现各异,因而常引起养殖户的认知错误,导致贻误防治良机。

本病传染源为病猪或带毒猪,病原是圆环病毒,虽有血清型,但二型是主要致病病毒,可引起如下疾病。

初生仔猪震颤症:因母猪感染该病毒,致使仔猪胚胎期脊髓鞘锁不全,仔猪出生后全窝或部分发生全身性有节律的震颤,导致不能吮乳饥饿而死亡。如能人为干预,辅助吃奶,可有痊愈的可能。如不加入人为辅助,可造成全部或大部分死亡。临床也可能出现出生时没有表现症状,3-7天后出现震颤症的,生产实践证明,哺乳期间症状出现越晚,成活的可能性越大,反之则小。目前还

没有可靠疗法,必须通过母猪免疫来控制。

多系统衰竭综合征:常发生于断奶后仔猪,俗称“秧呛病”。患猪精神不佳、食欲不振、浑身无力、腹泻、气喘、眼睑水肿、贫血、消瘦、发育明显迟缓,多为僵猪。患场发病率5-30%,死亡率5-40%。剖检可见多处淋巴肿大、肝硬化、肺脏萎缩灰色呈棕褐色,脾肿大坏死,胸腔积液、黏连,多脏器实质变性、坏死。

皮炎肾病综合征:患病猪多在腹部出现指甲至铜钱大小、与皮肤同色的皮肤斑块,中心部逐渐发红出血,不断扩大变紫,结痂脱落后露出鲜肉。病猪患部发痒、不安,用发痒部位磨蹭墙壁、木桩等物,影响食欲和休息。该病多发于百斤左右的保育猪,发病初始是一头,随之出现多头乃至全群、全舍。发病率高,死亡率小,严重的因饥饿、水肿、高热衰竭

死亡。断奶前注射疫苗具有很好的保护作用,即使个别发病,症状也较轻,死亡率也很低。病死猪剖检可见肾脏肿大、苍白、有出血点或坏死点,有时可见腹水和心包液。目前没有特效疗法,只能根据临床症状对症治疗,如肌注地塞米松,皮肤喷洒可用地塞米松稀释的青霉素溶液消炎、预防细菌感染。

母猪繁殖障碍症:感染母猪发情迟缓或无序,不易受孕,受孕后可能产木乃伊胎、流产、死胎或弱仔。该病仅靠临床症状确诊比较困难,需进行病原学、血清学检测,如免疫荧光、酶联免疫吸附、单克隆抗体等试验方法。治疗尚无针对性强的有效方法,临床中常在饲料中添加抗菌素避免混合感染以降低发病率和死亡率。该病主要依靠免疫接种来预防,目前用灭活疫苗进行肌注可有效减少该病的发生。

水稻病虫害防控技术

水稻专家 李晓光

由于水稻常年连作以及耕作方式变化,易使病虫害发生加重。根据我省2023年病虫害预测预报,今年需重点关注以下病虫害:水稻纹枯病、稻瘟病、二化螟等,以下几点生产技术供参考。

科学用药,提高病虫害防治效果

要时时关注天气预报及病虫害预警信息,及时采取防控措施。选择低毒、高效、低残留的农药,不得使用国家明令禁止生产或已经撤销登记的农药。严格按说明书规定的用药剂量、用药次数、用药方法和安全间隔期施药,不得任意增加用量,以免造成药害。做好农药废弃物处理和施药人员安全防护工作,防止农药污染环境,防止农药中毒事故发生。使用过的农药包装物不得随意乱丢,未使用完的农药应妥善存放。用药浸泡

过或包衣过的种子不能用作饲料。植保器械作业过程中避免重喷、漏喷,防止药害发生。

水稻田病虫害防控技术

育秧棚病虫害防控:浸种时注意防治水稻恶苗病、干尖线虫病。苗期预防立枯病发生,低温炼苗,加强栽培管理,培育壮苗。插秧前施药预防本田潜叶蝇危害。苗床使用除草剂封闭除草。药剂使用时按说明书规范操作,不得随意加大或减少使用剂量。

稻瘟病防控:选用抗稻瘟病品种;合理施肥,增施钾肥、硅肥,提高水稻抗病性。穗颈瘟防治原则以预防为主。孕穗期和齐穗期是防治穗颈瘟的最佳时期。可选用2%春雷霉素水剂或三环唑可湿性粉剂等。避免长期单一使用同一药剂,严格按照药剂使用说明书施药,遵守药剂

安全间隔期。

纹枯病防控:一般在水稻分蘖末期从发病率达5%时,或拔节至孕穗期从发病率为10-15%的田块,采用药剂防治。推荐使用药剂:井冈霉素、噻呋酰胺等。施药时全株均匀喷雾,重点喷稻株中下部。

二化螟防控:利用性信息素防治二化螟成虫,在二化螟成虫始盛期,每亩放置1个二化螟诱捕器,内置诱芯1个,每30天换一次诱芯,放置高度高出作物10厘米。释放赤眼蜂防治二化螟,在二化螟产卵初期混合释放大、小卵赤眼蜂防治二化螟,每次每公顷放蜂15万头,每隔7天放一次,共放蜂3次,总计每公顷45万头。药剂防治二化螟,在田间二化螟卵孵化盛期至低龄幼虫初期,可用苏云金杆菌、阿维菌素、氯虫苯甲酰胺等药剂喷施。

早春是香菇菌棒的转色期,这一时期受温度、湿度、光照和通风等环境条件影响较大。如果环境不适宜,香菇菌袋内会产生过多的红色水珠,香菇菌棒转色慢,菌皮厚,出菇困难。如何让香菇菌棒在适宜的环境条件下转色是这一时期的管理重点。

香菇菌棒转色方法

香菇菌袋内长满白色菌丝后即进入转色期,由于是带袋转色,香菇菌棒转色缓慢。所以,在香菇菌袋发菌期要进行2次刺孔通风,促进料袋分离,使香菇菌棒快速转色。正常情况下,在香菇菌袋接种点的菌丝直径长至10-12

厘米时进行第一次刺孔通风,1个菌袋刺孔8-10个,刺孔是结合倒堆进行的。菌袋刺孔后,发菌棚内温度快速升高,此时要加强通风,即打开轴流风机向室外排放热空气,降低棚内温度至26℃以下;温度高杂菌污染严重,而且香菇菌袋内会出现大量的红色水珠。空气相对湿度控制在55-65%之间;空气相对湿度大可在发菌棚内地面铺塑料薄膜防潮,或放置干燥剂,降低棚内湿度。这一时期白天给予适当的散射光照,促进香菇菌丝产生色素,并快速转色。第二次刺孔通风是在香

预防菌袋内红色水珠产生方法

产生红色水珠的原因:香菇菌袋内产生红色水珠主要是由于转色期昼夜温差过大,一般超过10℃;白天温度高时,香菇菌袋内的水分蒸发出来,夜间温度低时蒸发出来的水蒸气冷凝成水珠留在袋内,经过15-20天,香菇菌袋内的水珠可集聚20毫升。因为冷凝水中含有大量的糖分及其他营

香菇菌棒转色的保障措施

食用菌专家 刘晓龙

养物质,如果菌袋内积水过多,杂菌孢子通过菌袋刺孔处进入香菇菌袋内,并在冷凝水中萌发生长,使香菇菌棒带有杂菌,转色差,夏季出菇发生烂棒。

预防方法:第一,在香菇菌棒转色期,尤其是菌棒刺孔后,控制发菌棚内的昼夜温差,使昼夜温差控制在8℃以内,即白天适当通风降温,夜间覆盖塑料薄膜保温,缩小昼夜温差,控制菌袋内红色水珠产生。第二,发现红色水珠产生过多可以加强通风,降低棚内湿度,使袋内红色水珠蒸发掉。

搭建供求桥梁,连接城乡市场,为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物品的供求信息,欢迎来电来信。

联系电话:0431-88600735

或拨打 12316 新农村热线 12582 农信通热线

求购

长春地区

■玉米120吨,1.3元/斤,长春市双阳区鹿乡镇孙先生。电话:15948263106

通化地区

■二手打豆机器一台,1000-2000元,柳河县三源浦镇张先生。电话:13278355358

辽源地区

■白鹅3000只,8元/只,辽源市西安区灯塔乡王先生。电话:13766085771

延边地区

■大量谷草,价格面议,敦化市孙先生。电话:13043378373

出售

长春地区

●稻花香大米,5元/斤,榆树市大岭镇。电话:13756331661、13074389832

●白菜20吨,0.3元/斤,榆树市八号镇刘先生。电话:15567042756

●五角枫树苗,1-2年生,长春市净月高新技术开发区李先生。电话:13578654803

●黑豆1万斤,3元/斤,农安县万金塔乡孙先生。电话:13159681495

●粉碎机(粉饲料)1台,1200元/台,农安县新农乡左先生。电话:15947802536

●8年生王族海棠1000棵,150元/棵,德惠市边岗乡郭女士。电话:18744184191

●大公鸡1600只,15元/斤,农安县伏龙泉镇邹女士。电话:13500862193

●榆树20棵,300元/棵,德惠市米沙子镇梁先生。电话:18744181614

●黑腿笨鸡1000只,16元/斤,长春市九台区苇子沟镇张先生。电话:15948211718

吉林地区

●常年出售中草药喂养无抗鸡蛋,永吉县于先生。电话:15590628181

●常年出售西门达尔牛,吉林市杨先生。电话:15843775177

●常年出售散养藏香猪肉礼盒,舒兰市李女士。电话:13234324222

四平地区

●牛150头,1.5万元/头,伊通县营城镇张女士。电话:15044465057

●黑豆7000斤,2.2元/斤,双辽市双山镇李女士。电话:15500418987

松原地区

●杨树苗和杨树50万棵,松原市宁江区新城乡万先生。电话:18343827069

通化地区

●桑黄、灵芝孢子粉,通化县高女士。电话:18626537627

●常年出售蔬菜大棚保温棉被、养殖场保温棉被,梅河口市周先生。电话:13634352838

白城地区

●常年出售绿色种植小麦面粉,大安市沈先生。电话:15844654488、15143636865

白山地区

●长白山赤灵芝,野黑蜂蜂蜜,长白山自家种植基地灵芝孢子粉,敦化市孟女士。电话:4001801778、15844385121

延边地区

●达维254、110,辽棒8号等多个品种大果榛子,敦化市李先生。电话:15844346245