

扫码关注12316专家短视频



答疑解惑

长春市九台区朱先生: 蚯蚓作饵料有哪些优点

答:蚯蚓含有丰富的营养成分,蛋白质含量约40%,还含有丰富的维生素A和维生素B。平时生活在腐殖质较多的土壤表层里,喜欢阴暗潮湿的环境。采集加工方法:下雨天,蚯蚓会自行爬到地面活动,此时即可收集。而晴天则在土壤中挖出、洗净,约一天后待其将泥土排泄干净,再洗净切成段喂鱼。(夏艳洁)

伊通县谭先生: 马误食异物怎么办

答:立即灌1000毫升液体石蜡加100克硫酸钠(芒硝)加50克鱼肝油,灌后牵遛30分钟。栓在舍内,两小时后开始腹泻,注意观察两天,看能否排出。如两天内不能排出,马又不进食,就要手术取出。(吴迪)

长岭县孙女士: 防治粘虫用啥药

答:防治粘虫最好在3龄前,特别要注意草荒、长势弱的地块,虫口密度达30头/百株就应该打药,可用触杀、胃毒、内吸的杀虫剂防治,如高效氯氟氰菊酯、氯虫苯甲酰胺、溴氰菊酯等杀虫剂喷雾防治。若虫龄大,发生严重时,建议选择两种以上复配药剂,喷雾时尽量避免中午高温时段,施药做好个人安全防护。(吴艳微)



大豆田如何进行化学除草

□ 植保专家 张振铎

为了保障大豆产能稳定供给,我国高度重视大豆生产,确定了扩种大豆等油料作物的发展方向,并出台了系列生产扶持政策和举措,大豆种植面积比上年有所增加。要保证大豆稳产高产,实现节本增效,就必须做好大豆化学除草这个生产环节。

播后苗前封闭除草

在大豆播种后5天以内,应该使用化学除草剂进行土壤封闭。所用除草剂种类要根据上年田间杂草发生状况来决定,在马唐、稗草、狗尾草等一年生禾本科杂草和藜、反枝苋、马齿苋等小粒种子的阔叶杂草为主的地块,可以使用仲丁灵、二甲戊灵、氟乐灵、乙草胺、异丙甲草胺、精异丙甲草胺、异丙草胺、噁草酮、乙氧氟草醚等药剂或含有这些药剂的混剂;在以藜、蓼、苍耳、菎草、苘麻、

鸭跖草等阔叶杂草为主的大豆田,可以选用丙炔氟草胺、2,4-D异辛酯、唑啉磺草胺、噻吩磺隆等药剂或含有这些药剂的混剂。

苗后茎叶处理

在大豆2-4片三出复叶,禾本科杂草2-5叶期,对稗、牛筋草、狗尾草、野黍等禾本科杂草发生数量较大的田块,可以使用精噁唑禾草灵、精吡氟禾草灵、高效氟吡甲禾灵、精喹禾灵、喹禾糠酯、烯草酮、烯禾啶等药剂或含有这些药剂的混剂。

在大豆2-3片出复叶,阔叶杂草2-4叶期,对反枝苋、凹头苋、蓼、鸭跖草、豚草等阔叶杂草发生数量较大的地块,可以使用氯酯磺草胺、噻吩磺隆、灭草松、三氟羧草醚、乙羧氟草醚、氟磺胺草醚、乳氟禾草灵等药剂或含有这些药剂的混剂。苍耳、苘麻等恶性杂草,可以使用氯酯磺

草胺或氟磺胺草醚等药剂或含有这些药剂的混剂。

注意事项

采用土壤封闭处理还是茎叶处理要视播种期土壤墒情而定,良好的土壤墒情有利于杂草吸收药剂,土壤墒情差的情况下应改用茎叶处理剂。

精吡氟禾草灵等芳氧苯氧基丙酸酯类或烯禾啶等环己烯酮类与氟磺胺草醚等二苯醚类或喹草酸甲酯等药剂混用,不要加入喷雾器械直接混合,要在一个药剂与水混合后,再加入另外一个药剂,混合后立即喷施,不能存放。

气候干旱影响药效发挥,此时可浇水后施药或添加助剂施药;注意茎叶处理剂在风力大于3级时易引起漂移药害。

使用每种药剂前要仔细阅读说明,注意遵循用量和范围等使用要求。

曲霉菌病的病原体主要是烟曲霉,烟曲霉主要分布于腐败的植物上和土壤中,它的易感动物多见于禽类,包括鸡、火鸡、鹅、鸭等都能感染,引发霉菌性肺炎。成年禽散发,幼禽呈爆发,发病率和死亡率都高,可达50%。

禽曲霉菌病预防要点

经常清理粪便,更换垫料。春季北方气温在零上十几度,鹅舍不但需要供热保暖,而且地面还要铺上十几公分的垫料供鹅俯卧保温防凉,此垫料需要2-3天更换一次。

剖检。死雏经实验室解剖,发现雏鹅肺脏黄白色绿豆大结节,有散在,有成堆,结节很像鱼眼球,手捻像硬胶皮,剖检4只死鹅全有,腹腔也有零星结节。

诊断。初步诊断为雏鹅曲霉菌病,初步确诊后建议立即更换垫料,起初两天更换一次,以后视病情3天更换一次。及时做好通风,保持室内干燥。舍内干燥通风可以降低霉菌生长速度,降低霉菌孢子浓度,提升空气质量,有利于雏鹅健康。由于当时北方气温较凉,要在阳光充沛的中午通风,并且舍内供暖不停,预防小鹅因冷热变化感冒。将小鹅赶到室外后,大开门窗,屋内可以打扫卫生,更换垫料等操作,根据气温情况选择通风时间,以便争取在1小时内结束。

治疗。采用0.2%硫酸铜溶液整群饮水,每日一次,每次每只鹅3毫升,连用5天。

□ 畜牧兽医专家 吕明

禽曲霉菌病预防要点

提高母羊多胎率和羔羊成活率技术

□ 畜牧兽医专家 刘清河

小尾寒羊适应性强、生产性能高,深受养殖户青睐。提高母羊多胎率及羔羊成活率是发展的根本,需掌握如下技术要点。

培育基础母羊群

为了发展优质母羊,建立优质基础母羊群,除选好种公羊进行纯繁或杂交改良外,还要坚持每年都在多胎母羔羊中优选优充实基础母羊群。应选体质健壮、体型匀称丰满、四肢发达、乳房规整、繁殖能力强、母性好、世袭多胎的杂交个体建立基础母羊群。种公羊可从种羊场购入白头杜泊羊、小尾寒羊或选择当地小尾寒羊优质公羔培育成种公羊。

加强日常饲养管理

要达到一产多胎的目的,需做好以下三点:日粮要营养丰富、均衡。除喂给一定量的粗饲料外,还要补给含有微量元素和多种维生素及钙质、盐的精饲料并保证

供给足够的清洁饮水。

管理要科学、规律。除提供舒适环境外,应满足羊的合群性不要单独舍饲;羊对疾病的反应不敏感,所以每天要认真观察,找出病羊并及时治疗;羊爱清洁、喜干厌湿、怕热耐寒,所以圈舍需干爽清洁;羊胆小怕惊,日常放牧及圈舍需避开大的声响;母羊怀孕后还要分前、中、后三期分别投给营养配比不同的精料,并加强管理,保证安全越冬。

做好疾病的预防、治疗。每年春秋两季必须按时接种小反刍兽疫、布氏杆菌病、口蹄疫及几个梭菌疫苗。定期对圈舍和活动场地消毒,预防传染病的发生。

选择好代乳母羊

多胎会出现羔羊哺乳困难,应将一胎多于三只的羔羊挑选健壮、体大的过继给其他母羊代乳。代乳母羊需选择奶水好、母性强、身体健康

的产后母羊,避免因吃不到奶而亡。为保证过继的羔羊健康成长,代乳母羊需要仔仔训练。代乳比人工饲喂成活率高,优势明显。

训练羔羊的识母能力

羔羊是通过声音来寻找母亲的,为了提高羔羊的成活率,整个代乳过程必须对过继羔羊进行识母能力训练。

代乳母羊的选择与训练

母羊具有哺乳两只羔羊的本领,而经训练过的母羊就会有哺乳三只羔羊的能力。选择代乳羊首先选择奶水好、母性强、身体健康、产单羔的母羊。过继羔羊的最佳日龄为三天。提前收集、保存代乳羊的羊水,接受过继羔羊时将羊水均匀地涂抹在过继羔羊的体表。过继开始时间最好在中午或晚上。代乳母羊需进行人工训练,使代乳母羊接纳过继羔羊。

发生粉段的原因及处理方法

灵芝粉段的具体原因:栽培灵芝的场地地势低洼,土壤含水量高,温度低,导致灵芝菌段内的菌丝充满水分导致粉段;灵芝菌段进棚过早,即在5月上旬灵芝菌段进棚、脱袋覆土,而地温低于10℃,使灵芝菌丝解体(粉段);灵芝菌段进棚覆土后马上喷水,提高了土壤含水量,土壤水分进入菌段内,在低温条件下菌丝窒息死亡(粉段);灵芝菌段进棚后直接覆盖遮阳网,导致棚内温度过低而粉段。

20-32℃;在灵芝畦床的覆土层撒一层石灰粉吸湿消毒,降低土壤含水量,抑制杂菌生长。

发生死芽原因及处理方法

灵芝菌段出芽后死亡的主要原因:除草剂药害,因春季灵芝大棚周边玉米种植户喷洒除草剂,而灵芝大棚全天打开棚门或塑料薄膜通风,除草剂通过刮风漂移进入灵芝棚内,造成灵芝大棚两头及通风口部位的芝芽死亡。灵芝大棚地温低、土壤含水量高,菌丝不能运输养分,导致芝芽死亡。

灵芝粉段和死芽咋处理

□ 食用菌专家 刘晓龙

发生灵芝粉段应按如下方法进行:首先将灵芝菌段从土壤中挖出,用刀切开看木段内的灵芝菌丝是否退化或解体,如果菌段内看不到灵芝菌丝或灵芝菌丝已经解体,这样的菌段不能出芝,要将灵芝菌段挖出晾干,第二年再重新利用栽培灵芝;如果灵芝菌段内的菌丝生长正常,只是菌段表面菌丝解体,按如下方法处理:白天加强灵芝大棚通风,降低土壤含水量;白天揭去塑料薄膜上的遮阳网,并闷棚增温,将棚内温度提高至

灵芝菌段出芽期死芽的处理方法:因除草剂药害发生死芽的要根据芝芽死亡情况进行处理,如果灵芝芽连同芝柄一同死亡,要将灵芝芽连根掰掉,重新覆土催芽;如果灵芝芽的上部死亡而芝柄未死亡的可将灵芝芽上部用刀割掉,然后在芝柄上重新生长。不是除草剂药害原因而死芽的要在上午和下午、温度在20-25℃时通风,通风时间1-2小时,降低土壤含水量;白天扣棚增温,夜间扣棚保温,提高棚内温度。

搭建供求桥梁,连接城乡市场,为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物品的供求信息,欢迎来电来信。

联系电话:0431-88600735

或拨打12316新农村热线 12582 农信通热线

求购

长春地区

■玉米120吨,1.3元/斤,长春市双阳区鹿乡镇孙先生。电话:15948263106

通化地区

■二手打豆机器一台,1000-2000元,柳河县三源浦镇张先生。电话:13278355358

辽源地区

■白鹅3000只,8元/只,辽源市西安区灯塔乡王先生。电话:13766085771

延边地区

■大量谷草,价格面议,敦化市孙先生。电话:13043378373

出售

长春地区

◆稻花香大米,5元/斤,榆树市大岭镇。电话:13756331661、13074389832

◆白菜20吨,0.3元/斤,榆树市八号镇刘先生。电话:15567042756

◆五角枫树苗,1-2年生,长春市净月高新技术开发区李先生。电话:13578654803

◆黑豆1万斤,3元/斤,农安县万金塔乡孙先生。电话:13159681495

◆粉碎机(粉饲料)1台,1200元/台,农安县新农乡左先生。电话:15947802536

◆8年生王族海棠1000棵,150元/棵,德惠市边岗乡郭女士。电话:18744184191

◆大公鸡1600只,15元/斤,农安县伏龙泉镇邹女士。电话:13500862193

◆榆树20棵,300元/棵,德惠市米沙子镇梁先生。电话:18744181614

◆黑腿笨鸡1000只,16元/斤,长春市九台区苇子沟镇张先生。电话:15948211718

吉林地区

◆常年出售中草药喂羊无抗鸡蛋,永吉县于先生。电话:15590628181

◆常年出售西门达尔牛,吉林市杨先生。电话:15843775177

◆常年出售散养藏香猪肉礼盒,舒兰市李女士。电话:13234324222

四平地区

◆牛150头,1.5万元/头,伊通县营城镇张女士。电话:15044465057

◆黑豆7000斤,2.2元/斤,双辽市双山镇李女士。电话:15500418987

松原地区

◆香瓜,价格面议,乾安县大不苏镇李文江。电话:18743848688

通化地区

◆桑黄、灵芝孢子粉,通化县高女士。电话:18626537627

◆常年出售蔬菜大棚保温棉被、养殖场保温棉被,梅河口市周先生。电话:13634352838

白城地区

◆常年出售绿色种植小麦面粉,大安市沈先生。电话:15844654488、15143636865

白山地区

◆长白山赤灵芝,野黑蜂蜜,长白山自家种植基地灵芝孢子粉,敦化市孟女士。电话:4001801778、15844385121

延边地区

◆达维254、110,辽榛8号等多个品种大果榛子,敦化市李先生。电话:15844346245