

扫码关注12316专家短视频



答疑解惑

敦化市杜先生：
鱼苗下塘有哪些注意事项

答：清塘药物毒性消失后下塘生石灰7-8天；漂白粉4-5天。调节温差不超过2℃。饱食下塘暂养在鱼苗下塘前，放在网箱中暂养，喂熟蛋黄水，见鱼苗肠中明显呈黄色，然后下塘。要彻底清除野杂鱼类、水生昆虫等。（夏艳洁）

农安县王先生：
猪皮肤感染疥螨咋办

答：疥螨是一种体外寄生虫。猪皮肤感染一般与饲料无关。猪舍环境潮湿、光照不足、阴暗、寒冷多发。改善猪舍环境保持干燥。注射伊维菌素或者阿维菌素，患处喷洒除癞灵。使用时看好说明书，按说明使用，喷洒除癞灵后应避免其他猪舔食，以免造成中毒。（薄晓威）

梨树县徐先生：
怎样防治稻瘟病

答：水稻稻瘟病主要以预防为主，叶瘟发现打药就行，不用提前预防，但穗颈瘟必须提前预防，在水稻破口期和齐穗期各打一次药，可选春雷·三环、枯草芽孢杆菌、稻瘟灵、井酮三环唑、呋菌酯·戊唑醇等药剂防治，选择晴天露水干后打药，充足水量，以免影响药效。（曲文龙）



家禽异食癖如何治疗

畜牧兽医专家 吴迪

家禽异食癖在兽医内科学中称啄癖，主要临床表现为采食水泥块、粪便等非食物物质，或相互之间啄羽、啄肛、啄趾、啄蛋等异常嗜好。

主要发病原因：饲养环境光照太强、光色不适或环境高温高湿及通气不良；饲养密度大、拥挤，导致互相争夺饮水或吃饲料的最佳位置；消化道或体表有寄生虫直接刺激或产生毒素的刺激；饲料单一、营养不均衡或缺乏某种营养物质，如必须氨基酸、维生素D、B和微量元素钙、磷、锌、锰等；品种不同或日龄不同、个体差异较大的禽类在同一圈舍中混养。

症状：禽群中突然有一只啄食非食物物质，如墙壁、塑料制品、土块、砖块等，继而出现啄其他同类羽毛或肛门，很快有同种现象的病禽增多，可能导致全群互相啄羽、啄肛。

预防：加强饲养环境管理，做到圈舍和运动场光照不要过强，每只禽所占面积随日龄的增大而扩大，日粮的营养搭配要均衡，特别注意蛋白含量及矿物质、多种维生素的添加。定期投喂驱虫药。避免不同体重、大小、日龄或不同来源的禽类在一起饲喂。

治疗：及时增加饲养面积，一月龄时在饲料中拌入阿苯达唑，全群体重相加后，按每公斤10-20毫克的总量一次性饲喂。日粮中营养物质要全价，应含有适量的粗蛋白和能量以及粗纤维，还要添加必须氨基酸和微量元素，连用7天以上。要隔离已有外伤的患禽。饮水或日粮中添加1%的食盐，连用2-3天。啄羽的可在饲料中加2%的石膏粉，连喂3-5天。对已被啄伤出血的部位要涂上5%的碘酊或紫药水避免感染。

雨季要严防羊吸虫病

畜牧兽医专家 刘清河

多雨季节是羊吸虫病的多发期，尤其是我省西部草原和东部半山放牧的小尾寒羊和山羊。羊易感的吸虫中只有血吸虫是线状，其他都是扁平状的叶状及舌状。

吸虫主要侵害羊的消化系统，仅少数侵害循环系统。

侵害消化系统的有：片形吸虫（也称肝片吸虫、羊肝蛭）、双腔吸虫，两者常混合感染。健康羊自吞噬虫卵到长成成虫需2-3个月，可在肝脏中寄生3-5年。分急性、慢性两种。急性的引起肝炎症状，如精神沉郁、食欲不振、粘膜苍白、体温上升，出现症状后3-5天死亡。慢性的多发于冬、春季，患羊渐瘦、贫血、下痢、眼睑及下颌水肿，终因衰竭而死亡。阔盘吸虫，多寄生在羊的胰管及十二指肠中，虫体多时可

◆大公鸡1600只，15元/斤，农安县伏龙泉镇邹女士。电话：13500862193
◆榆树20棵，300元/棵，德惠市米沙子镇梁先生。电话：18744181614
◆黑腿笨鸡1000只，16元/斤，长春市九台区苇子沟镇张先生。电话：15948211718

吉林地区
◆蜂蜜500斤，椴树蜜、百花蜜25元/斤，苏子蜜30元/斤，永吉县一拉溪镇郭先生。电话18243255197
◆常年出售西门达尔牛，吉林市杨先生。电话：15843775177
◆常年出售散养藏香猪肉礼盒，舒兰市李女士。电话：13234324222
四平地区
◆牛150头，1.5万元/头，伊通县营城镇张女士。电话：15044465057
◆怀孕母猪64头，后备母猪120头，梨树县金女士。电话13944481871

延边地区
◆大量谷草，价格面议，敦化市孙先生。电话：13043378373

出售

长春地区
◆稻花香大米，5元/斤，榆树市大岭镇。电话：13756331661、13074389832
◆爆裂玉米5万斤，长春市净月开发区卢先生。电话：17131860006
◆散养鸡600只，长春市九台区东湖镇霍女士。电话：15643138462
◆黑豆1万斤，3元/斤，农安县万金塔乡孙先生。电话：13159681495
◆生猪8头，340-350斤/头，榆树市大岭镇。电话：13756824591
◆8年生王族海棠1000棵，150元/棵，德惠市边岗乡郭女士。电话：18744184191

水稻纹枯病防治方法

植保专家 张振铎

水稻纹枯病又称云纹病，俗名花脚秆、烂脚瘟、眉目斑，该病由立枯丝核菌侵染引起，在我国水稻产区普遍发生，轻者可造成叶鞘和叶片提早枯死，影响谷粒灌浆，形成大量秕谷，重者使水稻不能正常抽穗，甚至全株腐烂，使水稻结实率下降，千粒重减轻，严重降低水稻产量。

病害症状

水稻纹枯病从苗期至穗期均可发生，一般在分蘖盛期开始发生，拔节期病情发展加快，孕穗期前后是发病高峰，乳熟期病情下降。该病属高温高湿型病害，适宜范围内，湿度越大，发病越重。叶鞘染病，在近水面处产生暗绿色水浸状边缘模糊小斑，逐渐扩大呈椭圆形或云纹形；后期病斑中部呈枯白色或灰褐色，湿度大为深灰色，严重时数个病斑融合形成大病斑，呈不规则状云纹斑。重病叶鞘常致

其上部叶片发黄枯死。叶片发病，病斑也呈云纹状，边缘暗褐，发病快时病斑呈污绿色，叶片很快腐烂。严重时影响稻穗，穗颈、穗轴、颖壳等部位，初为污绿色，后变灰褐，常不能抽穗，抽穗的也出现较多秕谷，千粒重下降。阴雨潮湿时，病部长出白色网状菌丝，附着于组织表面或邻近稻株之间，后汇聚成白色菌丝团，形成菌核，菌核深褐色，易脱落，成为下一季初侵染来源。

防治方法

清除菌源。打涝菌核，减少菌源，上年纹枯病发生的水稻地块，要在春季稻田翻耕灌水耙地时，用细纱网或布网等工具打涝浮在水面上的菌核，带出田外深埋或晾干后烧毁；防止病稻草或未腐熟的病草还田。

加强栽培管理。合理密植，改善群体通透性。根据水稻生育时期、土壤

7月，玉米田间陆续有蚜虫发生，本文介绍蚜虫的发生与防治，降低危害损失。

蚜虫，老百姓俗称起腻、起蜜，分有翅、无翅两种类型，蚜虫的繁殖能力强，1年10-20个世代，在夏季温暖条件下，完成一个世代只需4-5天，生殖方式多样，可有性、无性生殖，也可产卵或直接产出幼虫。

危害症状

成蚜、若蚜刺吸植株汁液。玉米拔节期，危害新生的心叶，在玉米上繁殖，在展开的叶面可見到一层密布的灰白色脱皮壳，

发生条件

蚜虫的发生与气候条件有一定的关系，干旱年份往往发生较重，一般6月下旬蚜虫由其它寄主迁往玉米，进行大量繁殖，迁移数量也是发生轻重的一个因素。

防治指标

提醒农户要及时到地里查看，当玉米拔节期，发现中心蚜株喷药防治，可有效控制蚜虫的危害。在盛发期当有蚜株率达30-40%，出现“起油株”时应进行全田防治。

防治方法

清除田间杂草，减少田间寄

发生玉米蚜虫怎么用药

作物栽培专家 朴春红

这是玉米蚜虫危害的主要特征。抽雄期前后，危害玉米雄穗，造成空秆或小棒，穗期除刺吸汁液外，发生严重时蚜虫密布于叶背、叶鞘和穗部的穗苞或花丝上取食，排泄的“蜜露”，黏附在叶片上，引起煤污病，在叶面形成一层黑色的霉状物，影响光合作用，千粒重下降，引起减产。同时蚜虫大量吸取汁液，使玉米植株水分、养分供应失调，影响正常灌浆，导致秕粒增多，百粒重下降，在苗期还能传播病毒病。

主。种子处理，使用含吡虫啉、噻虫嗪等成分种衣剂进行包衣，可有效降低前期蚜虫密度。

在蚜虫发生达到防治指标时，可用10%吡虫啉可湿性粉剂均匀喷雾，也可用下列药剂：25%噻虫嗪，4.5%高效氯氟菊酯乳油，25g/L溴氰菊酯乳油。

施用方式：建议使用无人机进行喷洒防治，可结合喷洒叶面肥、化控药等一起防治。但要注意药剂之间是否可以混合，同时做好防护，保障人身安全。

搭建供求桥梁，连接城乡市场，**免费**为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物品的供求信息，欢迎来电来信。
联系电话:0431-88600735

或拨打12316新农村热线
12582农信通热线

求购

长春地区
◆玉米120吨，1.3元/斤，长春市双阳区鹿乡镇孙先生。电话：15948263106
通化地区
◆二手打豆机器一台，1000-2000元，柳河县三源浦镇张先生。电话：13278355358
辽源地区
◆白鹅3000只，8元/只，辽源市西安区灯塔乡王先生。电话：13766085771