



敦化市杜先生：

鱼苗下塘有哪些注意事项

答:清塘药物毒性消失后下塘生石灰7-8天;漂白粉4-5天。调节温差不超过2℃。饱食下塘暂养在鱼苗下塘前,放在网箱中暂养,喂熟蛋黄水,见鱼苗肠中呈明显的黄色证明吃饱了,然后下塘。要彻底清除野杂鱼类、水生昆虫等。(夏艳洁)

长春市双阳区王先生：

猪瘟后舍内怎样消毒

答:空舍时选用喷灯火焰灼烧耐高温的墙壁、地面及器具,再用2%氢氧化钠(火碱)溶液喷洒天棚、墙壁和地面,然后关闭门窗用高锰酸钾加甲醛熏蒸方法,熏蒸24小时进行彻底消毒后,开窗、门通风放气,两天后可以进猪。在有猪的情况下,常用的消毒剂有:过氧乙酸、戊二醛、碘制剂、漂白粉、石灰乳、季胺盐类、复合酚等,可以选择两种以上不同消毒剂交替使用。(薄晓威)

扶余市刘先生：

怎样预防玉米大斑病

答:玉米大斑病的发生主要与气候条件、品种抗性、侵染源等因素有关,中温高温的气候条件下发生严重,建议农户在发病初期打药,药剂主要选用苯醚甲环唑、啞菌酯、吡唑醚菌酯、丁香菌酯等,最好选择两种以上成份的杀菌剂,用药时尽量充足水分。(于国发)



牛羊流鼻血原因及防治方法

畜牧兽医专家 刘清河

养殖户偶尔会发现牛羊鼻孔中流出血液,有的是鲜血,有的是混有其他分泌物的带血液体,有的会流血不止,也会有自行停止。

牛羊鼻腔流出血液有多方面原因。

外部原因。放牧的牛羊群或圈舍拥挤易引起打斗或碰撞造成鼻粘膜破裂,或多或少会流出血液;采食时被尖锐物体刺入鼻腔,造成粘膜血管破裂,开始流出少量血液,如果当时拔出异物会引起较大的流血,如延时去除异物,可能自行止血而见鼻腔有血液流出。

内部原因。因饲养管理粗放,病牛营养不良、消瘦,造成肺热咳嗽或肺脏病变、坏死,偶尔激烈咳嗽时引起肺泡或细支气管血管破裂而流血;病原性细菌(巴氏杆菌、肺炎双球菌、肺炎杆菌、肺炎支原体等)感

染引起的气管、支气管、细支气管、肺泡出血性炎症造成的肺毛细血管破裂也会出血。

寄生虫侵染。除上述两种原因外,肺脏或气管、支气管感染寄生虫也会引发鼻腔炎症,从而引起流血。如放牧羊在7-9月份时鼻狂蝇将卵产在鼻孔后,幼虫爬行到鼻窦越冬,在第二年春季移行出鼻腔时造成鼻粘膜破裂出血。

预防措施。主要是加强管理、日粮要全价,环境要整洁干净,饲养场内无杂物,粗饲料中不混有尖锐异物。扩大牛的活动面积,不可过于拥挤。每年春、秋两季定期驱虫,同时肌肉注射伊维菌素或阿维菌素以除掉体内外寄生虫,羊群应在夏季选气候好的中午进行1-2次药浴。如发现牛羊流鼻血,尽快找出原因,消

除鼻腔的致病物后,标本兼治,可采取如下方法。

冷敷止血:用冰袋冷敷、凉水冲洗额头或用纱布浸凉凉水敷在鼻梁部使其血管收缩止血。也可将纱布塞入鼻孔部止血。

药物止血:鼻腔塞入用1%明矾液或0.1%肾上腺素浸泡过的纱布停留30分钟;如上述方法无效,可皮下注射5-10毫升0.1%的肾上腺素,或静脉注射300-500毫升的5%氯化钙。对流血严重、较多的可以肌注止血敏、安络血或维生素K。

药物防治:夏季在羊狂蝇活跃时期,可按每公斤体重0.2毫克皮下注射伊维菌素一次;也可用5%的来苏尔棉球擦拭鼻孔;还可利用5%敌百虫溶液10毫升注入羊的额窦;服用中成药犀角地黄加减汤也有治疗效果。

大球盖菇属草腐食用菌,主要利用稻草、玉米秸秆、麦麸、石灰和石膏等原料拌料后堆积发酵进行畦床栽培,不需要装袋、灭菌和接种,培养料发酵冷却后直接铺放到畦床上,再将菌种撒播在料面上覆土、发菌,一般播种50-60天进行出菇管理。

大球盖菇出菇管理措施

在8月下旬或9月上旬夜间最低温度达到15℃时向大球盖菇畦床喷水催菇,喷水前先将畦床表面杂草拔除,然后向畦面覆土喷水,当覆土湿润并进入培养料表层时停止喷水。

畦床喷催菇水后,出菇棚温度控制在15-25℃之间,白天温度高时在菇棚外覆盖稻草帘遮荫降温,夜间关闭通风口保温。

出菇棚内空气相对湿度控制在75-85%之间,空气相对湿度小要向畦床上的空间喷水增湿;每天中午温度高时打开通风口通风1-2小时。

注意事项

畦床喷催菇水后,个别畦床表面露出培养料,这是因为覆土薄或喷水时将覆土冲到畦床边上露出培养料,畦床喷水露出培养料要用细土覆盖,否则培养料失水严重,露出培养料的地方会延迟出菇或不出菇,影响产量。

喷水后7-10天畦面陆续出菇,此时停止喷水 and 通风,保持菇棚内的温湿度恒定,防止大球盖菇子实体原基死亡。

大球盖菇采收前两天停止喷水,否则大球盖菇子实体表面沾染泥土多,消费者购买后切根时泥沙难以削净。大球盖菇在菌盖尚未开伞时采收,并且采大留小,采收时不能碰伤小菇蕾。

大球盖菇出菇管理措施

食用菌专家 刘晓龙

母猪难产怎么办

畜牧兽医专家 吴迪

病,如子宫疾病、骨盆狭窄等。

胎儿性难产。如胎儿过大,双胎同时挤入产道,胎位、胎向或胎姿异常等。此种难产较多见。

母体性难产的处置方法:如属于生殖道疾病引起的难产,在进行一次剖腹产手术后就失去了种用价值应考虑淘汰。如是因产出无力、过度肥胖和瘦弱及老年猪,在探查子宫颈口完全开张的条件下可肌注催产素或乙烯雌酚或麦角新碱,仍不见效可进行剖腹产。

胎儿性难产的处置方法:确定是胎儿性难产时要采取如下几种办法解决。

回复正位:仔猪进入子宫后的正位为背与母猪平行、头部朝向母猪外阴,两前蹄压在头下、与嘴巴并齐。如有异常但仔猪存活,应在母猪不努责时,将胎儿回复正常胎向、胎姿或胎位。

辅助拉出:确定仔猪

猪妊娠期平均为114天左右。当到分娩日期,因各种原因引起的子宫颈口不开张或延时开张,或不能排除胎儿及排出时间延长,不经人为干预就不能产出胎儿的疾病,统称难产。母猪孕期已到,当发现母猪烦躁不安、频繁起卧、外阴红肿、流出液体并频频努责,但久久不见产出胎儿时,可确认为难产。

难产原因的检查。对孕猪进行孕期全面了解及临床检查,确定为难产后,医者要剪短指甲,用消毒液认真消毒手臂,其一手涂上肥皂液或液体石蜡,五指并拢呈锥形,缓慢伸入阴道探查产道状态、子宫颈口开张度、胎儿位置及状态,确定胎儿胎位、胎姿、胎势,分辨是哪种原因引起的难产。是母体性难产还是胎儿性难产。

母体性难产。是因孕猪原因引起的,如过度肥胖、过瘦或老龄导致的子宫收缩无力或生殖器官疾

近年来,我省平贝母种植面积较大,种植户在生产上经常遇到一些问题,本文从几方面介绍平贝母栽培技术,供种植户参考。

选地

平贝母最适宜的土壤是水份充足、排水良好、肥沃疏松、富含腐植质的黑油沙土与黄油沙土。沙土、黄土、盐碱地、低洼易涝地不宜栽培。

整地与作畦

平贝母多采用畦栽法

播种时间与方法

播种以6月下旬为宜,

大豆,在第一垄的垄沟里用平锹挖一宽40厘米,深4-5厘米的土槽,然后撒播上种栽,选直径0.4-0.8厘米鳞茎作种栽,播量35千克/1000平方米,然后用同样的方法在第二垄的垄沟里挖槽,挖出的土正好盖在第一垄沟的贝母种栽上,将土用耙子搂平、搂匀,使覆土层达4-6厘米。秋季上盖头垄。

平贝母栽培技术

中药材专家 关传海

和垄栽培法,畦栽法,畦宽100-200厘米,畦长因地势而定,作业道0.3-0.4米,作畦前要深耕。平贝母需肥量大,耕翻前应施入充分腐熟好的猪粪、马粪、鹿粪等做基肥,畦高应根据地势及地下水位而定,一般15-20厘米为宜。垄栽法,适宜粮

贝间作,将好的地翻耕,打60-65厘米宽的常规土垄,然后用2米的长木杆将垄尖搂平,打成高度6-8厘米的平垄,垄台上种玉米或者

最迟不能晚于8月份。移栽时先要选栽分级,一般大中小三级,直径≥1.5厘米的为

大鳞茎,可加工做货;直径在0.8-1.5厘米的为中鳞茎,直径小于0.8厘米的为小鳞茎,栽培时要分级移栽。

采收

地上部灯笼杆占20%即可收起,且要在地上秧子枯黄前收获完毕,过早低产、过晚色泽不好,产量一般在每亩500-750千克。

搭建供求桥梁,连接城乡市场,为农民朋友发布农产品、畜禽、种苗及闲置物品的供求信息,欢迎来电来信。

联系电话:0431-88600735

或拨打12316新农村热线
12582农信通热线

求购

长春地区

■玉米120吨,1.3元/斤,长春市双阳区鹿乡镇孙先生。电话:15948263106

通化地区

■二手打豆机器一台,1000-2000元,柳河县三源浦镇张先生。电话:13278355358

辽源地区

■白鹅3000只,8元/只,辽源市西安区灯塔乡王先生。电话:13766085771

延边地区

■大量谷草,价格面议,敦化市孙先生。电话:13043378373

出售

长春地区

◆稻花香大米,5元/斤,榆树市大岭镇。电话:13756331661、13074389832

◆爆裂玉米5万斤,长春市净月开发区卢先生。电话:17131860006

◆散养鸡600只,长春市九台区东湖镇霍女士。电话:15643138462

◆黑豆1万斤,3元/斤,农安县万金塔乡孙先生。电话:13159681495

◆生猪8头,340-350斤/头,榆树市大岭镇。电话:13756824591

◆8年生王族海棠1000棵,150元/棵,德惠市边岗乡郭女士。电话:18744184191

◆大公鸡1600只,15元/斤,农安县伏龙泉镇邹女士。电话:13500862193

◆榆树20棵,300元/棵,德惠市米沙子镇梁先生。电话:18744181614

◆黑腿笨鸡1000只,16元/斤,长春市九台区苇子沟镇张先生。电话:15948211718

吉林地区

◆蜂蜜500斤,椴树蜜、百花蜜25元/斤,苏子蜜30元/斤,永吉县一拉溪镇郭先生。电话18243255197

◆常年出售西门达尔牛,吉林市杨先生。电话:15843775177

◆常年出售散养藏香猪肉礼盒,舒兰市李女士。电话:13234324222

四平地区

◆牛150头,1.5万元/头,伊通县营城镇张女士。电话:15044465057

◆怀孕母猪64头,后备母猪120头,梨树县金女士。电话13944481871

松原地区

◆4年生杨树苗4000棵,直径6公分,长岭县。电话:15844888878

◆生猪1800头,300斤左右,松原宁江区绍先生。电话:13614386055

通化地区

◆常年出售蔬菜大棚保温棉被、养殖场保温棉被,梅河口市周先生。电话:13634352838

白城地区

◆常年出售绿色种植小麦面粉,大安市沈先生。电话:15844654488、15143636865

白山地区

◆长白山赤灵芝、野黑蜂蜂蜜,长白山自家种植基地灵芝孢子粉,敦化市孟女士。电话:4001801778、15844385121

延边地区

◆达维254、110,辽榛8号等多个品种大果榛子,敦化市李先生。电话:15844346245